

تریاز



■ کلمه "تریاز" از کلمه فرانسوی "*trier*"

■ به معنای "مرتب کردن" و "دسته بندی" کردن گرفته شده است تاریخچه کنونی تریاز به جنگهای دوران ناپلئون بناپارت بر می گردد. جراحی معروف به نام "**دومینینگ جین لاری**" در ارتش ناپلئون روش تریاز و جداسازی سریع آسیب دیدگانی که به فوری ترین مداخلات پزشکی نیاز دارند ابداع نمود. او این فعالیتها را در زمان وقوع جنگ و گسترش آن در زمان ناپلئون برقرار نمود.

تعریف

■ روش کلی برای انتخاب بیماران و تقسیم بندی آنها براساس فوریت نیاز به درمان

■ موثرترین تریاژ روشی است که برای کارکنان آسان باشد، نیاز به دسته بندی و ارزیابی با معیارهای پیچیده نداشته باشد و با این حال پیش آگهی بیماران را در حد مطلوبی تعیین نماید.

■ بر حسب مکان انجام به سه دسته تقسیم می شود.

■ تریاژ در صحنه

■ تریاژ در بخش اورژانس

■ تریاژ قبل از عمل جراحی

■ چهار رنگ در تریاژ وجود دارد

اولویت بندی قربانیان

■ اولویت اول یا Urgent که بسیار اورژانسی است

اولویت دوم Delayed اورژانسی است ولی زمان برای درمان هنوز حیاتی نیست.

اولویت سوم Walking Wounded ، قربانیان این طبقه آسیب جزئی دارند.

اولویت چهارم، افراد در حال مرگ یا مرده

گروه فوری (قرمز)

- بیماران اورژانسی که ضایعات مخاطره آمیز داشته و بدون اقدام درمانی سریع در کمتر از ۱ تا ۲ ساعت آینده جان خود را از دست داده یا دچار مشکلات شدید می شوند.
- خونریزی خارجی شدید و قابل کنترل
- مشکلات تنفسی قابل اصلاح
- جراحات شدید ناشی از آوار
- قطع شدگی عضو بطور ناقص
- پارگی های شدید همراه شکستگی باز
- سوختگی شدید صورت و راه های هوایی
- سوختگی های درجه ۲ و ۳ با وسعت ۴۰ درصد
- عدم هشیاری بدون علت مشخص
- نشانه های انفارکت میوکارد
- تشنج پایدار
- علایم دال بر زایمان قریب الوقوع یا زودرس
- مسمومیت شدید
- مراحل اولیه تا متوسط شوک

گروه تاخیری (زرد)

بیمارانی که جراحات شدید داشته و نیاز به مداخله درمانی و بستری دارند اما بدون درمان هم بیش از یک ساعت دوام خواهند آورد. به عبارت دیگر بین ۱ تا ۱۲ ساعت آینده باید خدمات درمانی مناسب به این بیماران ارائه شود

شکستگی های ساده استخوان های بزرگ

پارگی های متوسط بدون خونریزی

صدمات چشمی

آسیب دیدگی های غیربحرانی سیستم عصبی مرکزی بدون کوما

زخم های نافذ و سوراخ کننده شکم بدون شوک

دیابت بدون اختلال هشیاری

دسترس تنفسی غیرحاد

مشکل طبی غیرسرپایی

گروه سرپایی (سبز)

- افرادی که ضایعات خفیفی دارند که نه جانشان به خطر خواهد افتاد و نه دچار عوارض دائمی ناشی از آسیب می شوند و نیاز به درمان اورژانس ندارند.
- آسیب دیدگی های خفیف بافت نرم
- شکستگی های کوچک و بسته
- سوختگی های خفیف غیر از راه هوایی
- اختلالات عصبی روانی
- اختلالات زنان و زایمان
- شکایات طبی معمول
- آسیب دیدگانی که نیاز به اقدام خاصی ندارند

متوفیان (سیاه)

■ موارد فوت شده هستند.

انواع تریاژ

■ ابتدایی

■ اولیه

■ ثانویه

ترياز ابتدایي

- قبل از رسیدن پرسنل باتجربه و کارآموده بصورت ابتدایي توسط افراد محلی وباسرپرستی یک نفر از کارکنان بهداشتی-درمانی مانند بهورز
- اهمیت: بیماران دارای آسیب کمتر در ساعات اولیه حادثه که منابع درمانی محدودیت شدیدی دارند، موجب افزایش بار کاری مراکز درمانی نشوند وازطرف دیگر بیماران بدحال به سرعت به خدمات درمانی دست یابند.
- لازمه وجود چنین تریازی آموزش به پرسنل بهداشتی درمانی درسطوح پائینتری مثل خانه بهداشت یا مراکز بهداشت ودرمان است ونیز توجه و آموزش مردم که بهتر است با پشتیبانی شوراهای اسلامی شهریاروستا صورت گیرد
- اهالی منطقه اصول اولیه دسته بندی آسیب دیدگان را براساس نیاز به درمان وبا استفاده از رنگ های درنظر گرفته شده بدانند و با جمع آوری آسیب دیدگان دریک محل مشخص امکان انتقال سریعتر آنها فراهم آورند

روش تریاژ ابتدایی: اصول ابتدایی ارزیابی و دسته بندی

آسیب دیدگان برحسب وخامت حال عمومی

- باید رسیدگی به تدفین متوفیان و نیز درمان افراد در حال مرگ تا رسیدگی و انتقال سایر آسیب دیدگان به تاخیر بیفتد
- ابتدا باید آسیب دیدگانی منتقل شوند که حال وخیمتری دارند ولی در حال مرگ نیستند
- سپس آسیب دیدگانی منتقل شوند که نمی توانند بدون کمک راه بروند
- رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگانی که می توانند راه بروند، در مرحله بعدی اولویت قرار دارد.
- برای سهولت در انتقال و رسیدگی به آسیب دیدگان، باید هر گروه جداگانه ولی نزدیک به هم و نزدیک به جاده نگهداری شوند به نحوی که افراد با اولویت بالاتر به جاده نزدیک تر باشند.
- در صورت حضور پرسنل بهداشتی – درمانی در منطقه از روش START استفاده می شود.

S
T
A
R
T

Simple
Triage
And
Rapid
Transport

ساده
و
سريع
انتقال

دسته بندی

نیروی انسانی جهت تریاژ ابتدایی

■ کارکنان مراکز بهداشتی – درمانی

■ بهورزان

■ نیروهای مردمی

آموزش

- تریاژ به روش START به کارکنان بهداشتی – درمانی
- مفهوم تریاژ به مردم
- انتقال صحیح و مناسب آسیب دیدگان

■ تریاژ يك كار گروهی است. از يك مكان قبل از بیمارستان شروع می شود و تا زمانی که بیمار به بخش اورژانس می رسد ادامه دارد .

■ پس از آن نیز با ارزیابی های مجدد حتی در تمام مدتی که بیمار در انتظار است نیز ادامه می یابد

■ کارکنان تریاژ باید در زمینه روابط عمومی و بهترین شکل استفاده از دستورالعمل ها آموزش دیده باشند..

- Immediate
- Minor
- Delayed



جلیقه شناسایی متصدیان



اجزاء یک سیستم تریاژ

- کارکنان
- فضای کافی
- وسایل و تجهیزات
- وسایل ارتباطی
- سیستم ثبت اطلاعات

وظایف مسئول تریاژ

- بر چسب مخصوص تریاژ بر اساس شدت آسیب بر روی مجروحین نصب کند.
- گزارش پیشرفت عملیات و اقدامات مرتباً به مرکز خدمات پزشکی اورژانس (EMS) ارسال کند.
- انجام فقط و فقط مواردی که تهدید کننده جان (Life Treatment) هستند.
- انتقال بیماران بر اساس تقدم و اولویتها

معیارهای برخورد تریاژ

■ فوریت (وضعیت مصدوم)

■ احتمال بقاء

■ دسترسی به منابع مراقبتهای پزشکی

روند تریاژ میدانی در سه سطح صورت می گیرد:

1. تریاژ در صحنه (تریاژ 1) توسط امدادگران: مصدومین به دو گروه حاد (نوار قرمز) و غیر حاد (نوار سبز)
 2. تریاژ مدیکال (تریاژ 2) در محل ورودی پست مراقبتهای پزشکی پیشرفته (اورژانس صحرایی) توسط نیروهای مجرب درمانی در چهار سطح درمانی طبقه بندی می شوند.
 3. تریاژ انتقال (تریاز 3) مدیر پست مراقبتهای پیشرفته با هماهنگی پست فرماندهی و بیمارستان بر اساس وضعیت قربانیان و مقصد ، نوع وسیله و اسکورت درمانی تعیین می کند.
- قرمز- فوراً؛ توسط آمبولانس مجهز و اسکورت به اتاق عمل یا ICU
 - زرد: پس از گروه قرمز توسط آمبولانس و اسکورت امدادگر
 - سبز: در پایان عملیات توسط وسیله نقلیه موجود و بدون اسکورت
 - سیاه: به سردخانه

چهار مقوله ابتدایی در سیستم تریاژ

ARPM


- A• Ability توانایی بلند شدن و راه رفتن
- R• Respiratory وضعیت تنفسی
- P• Perfusion status وضعیت خونسازی
- M• Mental status وضعیت هوشیاری

START

RPM

■ Respiration's

- None - Open the Airway
 - Still None? DECEASED
 - Restored?- IMMEDIATE
- Present?
 - Above 30 - IMMEDIATE
 - Below 30 - CHECK PERFUSION




START

RPM

■ Perfusion

- Radial Pulse Absent
or
Capillary Refill > 2 secs
IMMEDIATE
- Radial Pulse Present
or
Capillary Refill $\leq$ 2 secs
CHECK MENTAL STATUS



START

RPM


Mental Status

- Can Not Follow Simple Commands (Unconscious or Altered LOC)

IMMEDIATE

- Can Follow Simple Commands

DELAYED



START سیستم تریاژ

مجروح در حال راه رفتن است؟
آسیب خفیف

تنفس

خیر
راه هوایی را باز کنید!
تنفس؟

خیر
سیاه

بله
فوری

بله

زیر 30 بار در دقیقه

بالای 30 بار در دقیقه؟
فوری

خونسانی؟

نبض رادیال وجود دارد
یا سرعت پرشدگی مویرگ کمتر
از 2 ثانیه است

نبض رادیال وجود ندارد
یا سرعت پرشدگی مویرگ
بیش از 2 ثانیه است.
فوری

وضعیت هوشیاری


نمی تواند از دستورات
ساده پیروی کند
فوری

می تواند از دستورات
ساده پیروی کند
تاخیری

خونریزی کنترل شود!

JUMP START





1. Ribbon
2. Triage Tags



Scince in 1976 In a MCI, Triage Tags are only used in the treatment area.

MIEMSS TRIAGE TAG DO NOT REMOVE

PATIENT INFORMATION

☐ MALE ☐ FEMALE AGE WEIGHT

NAME

ADDRESS

CITY ST PHONE

PATIENT NUMBER

1 3 0 0 4 1 3 8

TRIAGE STATUS

EVALUATION	TIME	RED	YELLOW	GREEN	BLACK
INITIAL		IMMEDIATE	DELAYED	MINOR	DECEASED
SECONDARY		IMMEDIATE	DELAYED	MINOR	DECEASED
		IMMEDIATE	DELAYED	MINOR	DECEASED
HOSPITAL		IMMEDIATE	DELAYED	MINOR	DECEASED

CHIEF COMPLAINT

Head Injury C-Spine
Blunt Trauma
Penetrating Injury
Burn Fracture
Laceration Amputation

Medical
Cardiac Respiratory
Diabetic OB/GYN
Haz-Mat Exposure

COMMENTS

TRANSPORTATION AGENCY/UNIT DESTINATION TIME ARRIVED

TREATMENT 1 3 0 0 4 1 3 8 **HOSPITAL** 1 3 0 0 4 1 3 8

OTHER 1 3 0 0 4 1 3 8 **OTHER** 1 3 0 0 4 1 3 8

OTHER 1 3 0 0 4 1 3 8 **OTHER** 1 3 0 0 4 1 3 8

OTHER 1 3 0 0 4 1 3 8 **OTHER** 1 3 0 0 4 1 3 8

TRANSPORT RECORD

☐ MALE ☐ FEMALE AGE

NAME

CHIEF COMPLAINT HOSP NOTIFIED

DESTINATION

TRANSPORTATION AGENCY/UNIT TIME OUT

PATIENT NUMBER

1 3 0 0 4 1 3 8

TRIAGE STATUS

RED YELLOW GREEN



FRONT

Time: _____			
Age: _____			
Gender: _____			
Address: _____			
City: _____			
State: _____			
Zip: _____			
Phone: _____			
Emergency Contact: _____			
Signature: _____			
© 2005 - All Rights Reserved 1-800-425-5397 www.metttag.com			
0		+	
I		🐾	
II		🐢	
III		🚫	





CONTAMINATED

Personal Property Receipt
Evidence Tag

413730

Destination
Via

413730

TRIAGE TAG

☐ S ☐ L ☐ U ☐ D ☐ G ☐ E
Serious Life Threatening Urgent Deceased Not Dead Not Dead

AUTO INJECTOR ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Trs	No	Gross Decon
Trs	No	Secondary Decon
Solution		
Blunt Trauma		
Burn		
C-Spine		
Cardiac		
Crushing		
Fracture		
Laceration		
Penetrating Injury		



Age

☐ Male ☐ Female

Other:

VITAL SIGNS

Time	B/P	Pulse	Respiration

Time	Drug Solution	Dose

EVIDENCE

MORGUE
Pulseless/Non-Breathing

413730

IMMEDIATE
Life Threatening Injury

413730

DELAYED
Serious, Non Life Threatening

413730

MINOR
Walking Wounded

413730

No. 239352 TRIAGE TAG No. 239352

PART I

No. 239352

CALIFORNIA FIRE CHIEFS ASSOCIATION

Leave the correct Triage Category (On the end of the Triage Tag)

Move the Walking Wounded	MINOR
No respirations after head tilt	DECEASED
☐ Respirations - Over 30	IMMEDIATE
☐ Perfusion - Capillary refill Over 2 seconds	IMMEDIATE
☐ Mental Status - Unable to follow simple commands	IMMEDIATE
Otherwise-	DELAYED

MAJOR INJURIES:

HOSPITAL DESTINATION:

ORIENTED ☒ DISORIENTED ☐ UNCONSCIOUS ☐

TIME	PULSE	B/P	RESPIRATION

DECEASED

IMMEDIATE No. 239352



DELAYED No. 239352

MINOR No. 239352


You place a triage tag on each victim and tear off the colors until the color at the bottom matches the victim's classification. **This tag shows the patient's category as "Immediate."**



تیم تریاژ



زمان ثبت			
فشارخون	/	/	/
نبض			
تنفس			
GCS			



0



0

I



I

II



II

III



III

1 0000

تیم تریاژ
10000



10000

تاریخ:/...../.....

ساعت:

نام و نام خانوادگی بیمار سن جنس

آدرس بیمار تلفن

آدرس محل حادثه:

یاخذه های بایلی :

.....
.....

0



I



10000

II




10000

III



10000



تریاز اولیه

- **روش: START**
- **نیروی انسانی:** پرسنل اورژانس، امدادگران هلال احمر، گروه سیار امداد پزشکی
- **تجهیزات:** کارت تریاز اولیه، مازیک ضدآب، لوازم ساده درمان (باند، گاز و تورنیکه)
- **درمان همراه:** بازکردن راه های هوایی مسدود به علت وجود جسم خارجی یا وضعیت نامناسب قرارگیری فرد آسیب دیده، کنترل خونریزی های شدید و فعال خارجی توسط پانسمان فشاری و تورنیکه
- **آموزش:** اصول و فلسفه تریاز، روش تریاز **START**، اقدامات احیای مقدماتی، آشنایی با کارت های تریاز و روش ثبت اطلاعات در آنها، مانور عملیاتی و کارگروهی

تریاز ثانویه

■ ارزیابی دقیق تر و توزیع مناسب خدمات درمانی توسط پرسنل کارازموده درجایی که امکانات احیای پیشرفته وجود دارد

■ در مواردی که تعداد آسیب دیدگان زیاد بوده و امکان انتقال تمام آنها به مراکز درمانی یا بیمارستان وجود ندارد و هنوز درمانگاه صحرایی نیز در محل احداث نشده است، شاید گروهی از آسیب دیدگان تا مدت زیادی در همان محل باقی بمانند. در این موارد از سیستم تریاز **SAVE** (secondary assessment of victim endpoint) استفاده می شود.

■ روش **SAVE** بر اساس تشخیص بیمارانی است که بیشترین استفاده را از مراقبت های موجود می برند.

ارزیابی مددجو در اورژانس

■ علائم حیاتی اولیه

■ تنفس را با مشاهده بالا و پایین رفتن قفسه سینه ارزیابی کنید. محدوده طبیعی تنفس

■ در بالغین: 12-20 بار

■ کودکان: 15-30

■ شیرخواران: 25-50

■ کیفیت تنفس:

■ تنفس عادی: فرد از عضلات فرعی استفاده نمی کند.

■ تنفس سطحی: اتساع مختصر قفسه سینه و شکم در دم

■ تنفس دشوار: صدای غیر عادی مثل خرخر کردن و استریدور

■ تنفس صدا دار: خرخر کردن، خس خس کردن، قل قل کردن، صدایی

■ ریتم تنفس

■ در بیماری داخلی، بعلت عدم تعادل شیمیایی یا آسیب مغزی است.

تنفس صدا دار

- خر خر کردن: انسداد نسبی در سطح حلق بوسیله زبان و اپی گلوت
 - برای رفع آن از ایروی یا پوزیشن سر استفاده می کنیم
- خس خس کردن: باریک شدن نایژه ها در ریه
- قل قل کردن: وجود مایع در راه های هوایی فوقانی
 - بلافاصله دهان را باز نموده و ترشحات را ساکشن کنید.
- استریدور: صداهای با فرکانس بالا و هنگام دم: انسداد نسبی راه هوایی فوقانی در سطح حنجره در اثر:
 - اسپاسم عضلانی ناشی از عفونت راه هوایی
 - واکنش های آلرژیک
 - سوختگی راه هوایی فوقانی
 - برای رفع آن تهویه با فشار مثبت

نبض

- نبضهای محیطی: رادیال، براکیال، تیبیال خلفی و دورسال پدیس
- نبضهای مرکزی کاروتید و فمورال
- همیشه نبضها را در محل های مختلف بررسی کنید.
- ریت
- کیفیت (0+ 1+ 2+ 3+ 4)
- ریتم

پوست

■ ظاهر و وضعیت پوست نشانگر مهم دیگری از گردش خون است.

■ رنگ

■ بستر ناخن یا قسمت گوشتی کف دست کنار اولنار

■ در کودکان و شیرخواران، پشت دست یا بالای پا را فشار دهید.

■ دما

■ وضعیت و پر شدگی مویرگ ها (در حد دو ثانیه طبیعی و بالای 3 ثانیه غیر طبیعی است)

مردمکها

■ واکنش به نور

■ مردمکهای کند و آهسته پاسخ حاکی از هایپوکسی یا خونرسانی ناکافی است.

■ مردمکهای ثابت و گشاد بعلت ایست قلبی، ضربه شدید به سر، خونرسانی ناکافی مغز

فشار خون

شرح حال

یاد افزای SAMPLE ■

S:(Signs and symptoms) ■

A: (allergies) ■

M:(medication) ■

P: past history ■

L(last meal) ■

E(events) ■

تعیین ماهیت مشکل

■ مشکلات بیمار:

■ تروما

■ نافذ

■ غیر نافذ

■ صدمات انفجاری (WMD)

■ داخلی

■ در اثر بیماری مثل حمله قلبی، سکته مغزی

■ مواد یا عامل محیطی تاثیر گذار بر بدن

■ مسمومیت دارویی

تعیین ماهیت صدمه در بیماران ترومایی

■ افتادن

- مسافتی که بیمار از آن افتاده
- سطحی که بیمار روی آن افتاده
- قسمتی از بدن که ابتدا زمین خورده

■ تصادف اتوموبیل

- تصادف از سر اتوموبیل
- تصادف از عقب اتوموبیل
- تصادف از پهلو
- تصادف چرخشی
- معلق زدن
- پرت شدن از اتوموبیل

The Haddon Matrix

ماتریکس Haddon

■ ویلیام هادون با تجزیه و تحلیل سیستماتیک تصادفات اتوموبیل یک ماتریس بدست آورد.

■ هدف پیشگیری از آسیب ها و استراتژی های کنترل موثر
ماتریکس اصلی جدول 3X 3 بود
بعدها به جدول 3X 4 گسترش یافته است

ماتریکس هادون

	وسیله نقلیه	عامل انسانی	محیط فیزیکی	محیط اجتماعی
قبل از حادثه				
در طی حادثه				
پس از حادثه				

ارزیابی بیمار

- ارزیابی صحنه
- ارزیابی اولیه در طی یک دقیقه
- برداشت کلی از بیمار
- تعیین وجود مشکل داخلی یا صدمه دیدگی بیمار
- پی بردن به شکایت اصلی
- شناسایی موارد تهدیدی کننده حیات

ارزیابی صحنه

- رعایت نکات ایزولاسیون ترشحات بدن
- ارزیابی مشکلات موجود در صحنه و ایمنی
 - حفاظت شخصی
 - حفاظت از بیمار
 - حفاظت از حاضرین
- تعیین مکانیسم صدمه یا ماهیت بیماری
 - بیمار ترومایی
 - بیمار مبتلا به مشکل داخلی
- تعیین تعداد بیماران
- تعیین نیاز به کمک های بیشتر برای مدیریت صحنه و درمان بیماران

مدیریت درد

- ارزیابی درد
- PQRSTT
- P: pain locatted
- Q:qualitty
- R:radiation
- S:severity
- T:time
- T:treatment

سایر سوالات

- آیا تنفس عمیق باعث درد می شود؟
- زمانی که درد شروع شد چه فعالیتی انجام می داد؟
- آیا سابقه درد دارد؟ آیا مثل قبلا است؟
- آیا اخیرا ترومایی به وی وارد شده؟ آیا درد با تهوع و استفراغ همراه بوده
- درد چه تاثیری بر سبک زندگی فرد داشته است؟
- چه نوع دارویی مصرف می کند؟ سابقه آلرژی؟

مداخلات کنترل درد

■ مداخلات غیر دارویی

■ ماساژ و تحریک جلدی

■ استفاده از گرما و سرما

■ روش های آرام سازی

■ تجسم هدایت شده

مداخلات دارویی

■ داروهای بی حس کننده موضعی

■ ژل لیدوکائین

■ پماد ELMA

■ پماد لیدوکائین

■ قطره تتراکائین

■ اسپری لیدوکائین

■ استنشاق گاز انتونوکس

■ ضد درد های غیر مخدر NSAID ضد التهاب غیر استروئیدی

■ آسپرین

■ ایبوپروفن - ایندومتاسین

■ دیکلوفناک سدیم

مسکن های مخدر

■ از طریق پوستی، خوراکی، زیر جلدی ، عضلانی، وریدی،
داخل نخاعی و رکتال تجویز می شود.

■ کدئین

■ مورفین

■ میپردین

■ پروپوفول

■ ترامادول

داروهای بی حس کننده تزریقی

- لیدوکائین 5-10 دقیقه اثر میکند و تا 2 ساعت باقی می ماند.
- بوپی و اکائین: طولانی اثر (4-8 ساعت) با شروع آهسته ؛ با غلظت پایین باعث بلوک اعصاب حسی بدون بلوک اعصاب حرکتی می شود.
- پروکائین: برای 3-10 دقیقه درد را از بین می برد. پس از یک ساعت بی اثر می گردد.



انتونوکس

- انتونوکس یعنی ترکیب اکسیژن و اکسید نیترو در یک کپسول، این مخلوط در داخل کپسول های آبی رنگ با گردن سفید عرضه می شود و دارای یک دریچه کاهش دهنده فشار، لوله با طول استاندارد و ماسک صورت است
- و اثرات بی دردی آن قابل مقایسه با اپیوئیدهای قوی است. انتونوکس باعث تسکین درد کوتاه مدت و همچنین کاهش اضطراب و درد در طیف وسیعی از اعمال دردناک نظیر خارج کردن درن، پونکسیون کمر، پانسمان و فیزیوتراپی می شود